


Retratos de **Aves del caquetá:** *un tesoro escondido en la selva Amazónica*



PROYECTO:
LIBRO Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE: "AVES DEL CAQUETÁ:
PATRIMONIO VISUAL, BIODIVERSIDAD Y MEMORIA ECOLÓGICA"

"Proyecto apoyado por el Programa Nacional de
Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes"

Retratos de **Aves del caquetá:** *un tesoro escondido en la selva Amazónica*



Publicado por:

Corporación Reserva Natural Buena Vista

Fotografías:

Yuldor Milciades Trujillo Ramirez
César Mauricio Trujillo Ramirez
Pablo Cubillos
Dayana Ospina
Joaquín Sánchez
Camila Sánchez
Jorge Muñoz Garcia

Comité editorial:

Jorge Muñoz Garcia
Camila Sánchez
Dayana Ospina

Diseño y diagramación:

Tucam Estudio Creativo
www.tucam.co

2026





Presentación



El Caquetá y la región amazónica son territorios privilegiados por su extraordinaria biodiversidad y majestuosos paisajes. Por eso, esta publicación rinde un homenaje a una pequeña parte de esta riqueza natural, las aves, que no solo embellecen nuestros paisajes con sus colores y cantos, sino que cumplen funciones vitales: dispersan semillas, controlan insectos y nos recuerdan la profunda interconexión entre la naturaleza y la vida humana.

Esta obra es un llamado a la generación de conocimiento, a la conservación y a la promoción de acciones que propendan por la permanencia de las cualidades naturales de la región Amazónica desde la escuela y desde los jóvenes. Así mismo, es fruto de un esfuerzo colectivo que une ciencia, arte y compromiso con la tierra. Cada fotografía refleja la pasión de quienes creen que mostrar la riqueza natural es también una forma de protegerla.

Especialmente a los jóvenes, queremos dejarles una invitación: que estas páginas sean una ventana para descubrir, valorar y defender el patrimonio natural que nos rodea. Ustedes son la generación que puede asegurar que las aves sigan volando libres en nuestros cielos y que la Amazonía continúe siendo fuente de vida para el mundo.

Que este libro inspire curiosidad, respeto y acción. Que motive a observar con atención, a preguntar con entusiasmo y a comprometerse con la conservación de la Amazonía, nuestra casa común.



Índice



Abreviaturas.....	5
Órden Apodiformes.....	6
Órden Charadriiformes.....	12
Órden Ciconiiformes.....	13
Órden Cuculiformes.....	14
Órden Pelecaniformes.....	15
Órden Cathartiformes.....	18
Órden Accipitriformes.....	20
Órden Strigiformes.....	23
Órden Trogoniformes.....	25
Órden Coraciiformes.....	28
Órden Galbuliformes.....	30
Órden Piciformes.....	33
Órden Falconiformes.....	39
Órden Psittaciformes.....	40
Órden Passeriformes.....	44
Reconocimientos.....	80



Abreviaturas



CATEGORÍAS UICN

 EX	(Extinto)	 NT	(Casi Amenazado)
 EW	(Extinto en Estado Silvestre)	 LC	(Preocupación Menor)
 CR	(En Peligro Crítico)	 DD	(Datos Insuficientes)
 EN	(En Peligro)	 NE	(No Evaluado)
 VU	(Vulnerable)		

SEXO

	(Macho)
	(Hembra)

GREMIO DE FORRAJEO

CAR (Carroñero): Aves que comen animales ya muertos.

GR (Granívoro): Aves que comen semillas.

FRU (Frugívoro): Aves que comen frutas.

INS (Insectívoro): Aves que comen insectos.

NEC (Nectarívoro): Aves que toman el néctar dulce de las flores.

AQ (Acuático): Aves que cazan peces o plantas en el agua.

VER: Consumidores de vertebrados

VEA: Consumidores de vertebrados acuáticos



Ermitaño Picogrande

Nombre científico: *Phaethornis malaris*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: INS / NEC

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de néctar actuando como polinizador de plantas del género *Heliconia* y *Pitcairnia*. Ocasionalmente incluye artrópodos en su dieta, puede estar actuando como controlador de insectos que pueden llegar a considerarse plaga.

Fotografía:

Cesar Trujillo



Colibri Ecuatoriano

Nombre científico: *Phlogophilus hemileucurus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: NEC

 Florencia, Caquetá, Reserva la Tortuga

Importancia de la especie:

Se alimenta de nectar por lo que su función ecológica es actuar como polinizador.

Fotografía:

Yuldor Trujillo

Orden: Apodiformes

Familia: Trochilidae



Helechero común

Nombre científico: *Haplophaedia aureliae*

UICN: 

Gremio de forrajeo: NEC

 Florencia, Caquetá, Reserva la Tortuga

Importancia de la especie:

Su dieta se basa principalmente en el consumo de néctar, se entiende como polinizadores de diferentes plantas con flor.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Colibri ventrirrojo

Nombre científico: *Urosticte ruficrissa*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: NEC

 Florencia, Caquetá, Reserva la Tortuga

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de néctar de flores del género *Clusia* y *Palicourea* actuando como polinizador.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Ninfa morada

Nombre científico: *Thalurania furcata*

UICN: 

Gremio de forrajeo: NEC

📍 Florencia, Caquetá, Vereda la Ruidosa

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de néctar de flores principalmente de la familia Rubiaceae (Psychotria, Hamelia y Syphilis).¹¹ También incluye epífitas (Bromelia), lianas (Combretum), enredaderas, (Gurania), árboles (Inga, Erythrina, Genipa, Tachigali, Syzigium) y hierbas (Heliconia, Costus) actuando como polinizador.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Amazilia andina

Nombre científico: *Uranomitra franciae*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: NEC

📍 San Vicente del Caguán, Caquetá, Reserva El Pescador

Importancia de la especie:

Se alimenta de nectar por lo que su función ecológica es actuar como polinizador.

Fotografía:

Dayana Ospina



Pati amarillo menor

Nombre científico: *Tringa flavipes*

UICN: 

Gremio de forrajeo: INS / VEA

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos y en algunas ocasiones de vertebrados acuáticos, actuando como controlador de poblaciones y de plagas de insectos.

Fotografía:

Pablo Cubillos



Jabirú

Nombre científico: *Jabiru mycteria*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: VER

 San Vicente del Caguán, Caquetá

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de vertebrados, actuando como controladores de la población o depredadores naturales.

Fotografía:

Camila Sánchez



Cucullo de pico amarillo

Nombre científico: *Coccyzus americanus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: INS

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente en insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Pablo Cubillos



Garza silbadora

Nombre científico: *Syrigma sibilatrix*

UICN: 

Gremio de forrajeo: VEA

 Cartagena del Chairá, Caquetá

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de vertebrados acuáticos, actuando como filtradores de nutrientes en ecosistemas acuáticos

Fotografía:

Joaquín Sánchez



Hoco oscuro

Nombre científico: *Tigrisoma fasciatum*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: VEA

📍 San Vicente del Caguán, Caquetá, Cajones del Rio Pato

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de vertebrados acuáticos, actuando como filtradores de nutrientes en ecosistemas acuáticos

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Garceta grande

Nombre científico: *Ardea alba*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: VEA

 Florencia, Caquetá, Vereda Tominejo

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de vertebrados acuáticos, actuando como filtradores de nutrientes en ecosistemas acuáticos

Fotografía:

Yuldor Trujillo

Orden: Cathartiformes

Familia: Cathartidae



Rey de los gallinazos

Nombre científico: *Sarcoramphus papa*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: CAR

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de carroña, por lo que su función ecológica es actuar como cicladores de nutrientes.

Fotografía:

Pablo Cubillos



Guala Amazónica

Nombre científico: *Cathartes melambrotus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: CAR

 Florencia, Caquetá, Vereda Sucre

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de carroña, por lo que su función ecológica es actuar como cicladores de nutrientes.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Caracolero Piquiganchudo

Nombre científico: *Chondrohierax uncinatus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: VER

 Florencia, Caquetá, Batallon Liborio Mejia

Importancia de la especie:

Su dieta se basa principalmente en el consumo de vertebrados, se entienden como controladores de la población o depredadores naturales.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Aguila real de montaña

Nombre científico: *Spizaetus isidori*

UICN: 

Gremio de forrajeo: VER

 Florencia, Caquetá, Vereda Sucre

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de vertebrados, por lo que su función ecológica es el actuar como depredador de mamíferos pequeños y medianos ejerciendo un control poblacional.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Gavilán pollero

Nombre científico: *Rupornis magnirostris*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: VER / INS


📍 Florencia, Caquetá, Zona Urbana

Importancia de la especie:

Incluye en su dieta tanto vertebrados pequeños e insectos actuando como controlador de plagas.

Fotografía:

Pablo Cubillos



Lechuza campanaria

Nombre científico: *Tyto alba*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: VER

 Puerto Rico, Caquetá, Montecristo

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de vertebrados, actuando como controladores de la población o depredadores naturales.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Buho barrado

Nombre científico: *Pulsatrix melanota*

UICN: 

Gremio de forrajeo: VER

📍 Florencia, Caquetá, Reserva La Avispa

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de vertebrados, actuando como controladores de la población o depredadores naturales.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Quetzal

Nombre científico: *Pharomachrus antisianus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia, Caquetá, Vereda La Ruidosa

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Trogon coliblanco

Nombre científico: *Trogon viridis*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Camila Sánchez



Trogón enmascarado

Nombre científico: *Trogon personatus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia, Caquetá, Vereda La Ruidosa

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Barranquero pechicastaño

Nombre científico: *Baryphthengus martii*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU / INS

 Florencia, Caquetá, Reserva La Avispa

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Barranquero

Nombre científico: *Momotus aequatorialis*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU / INS

📍 Florencia, Caquetá, Vereda Divino Niño

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Jacamar orejiblanco

Nombre científico: *Galbalcyrrhynchus leucotis*

UICN: 

Gremio de forrajeo: INS

 Puerto Rico, Caquetá, Vereda Montecristo

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Jacamar cobrizo

Nombre científico: *Galbula pastazae*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: INS

📍 Florencia, Caquetá, Reserva La Tortuga

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Jorge Muñoz García



Jacamar grande

Nombre científico: *Jacamerops aureus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: INS

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Cesar Trujillo



Torito coronado

Nombre científico: *Capito aurovirens*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Puerto Rico, Caquetá, Vereda Montecristo

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Cabezón dorado

Nombre científico: *Capito auratus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia, Caquetá, Vereda La Holanda

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Diostede

Nombre científico: *Ramphastos ambiguus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia, Caquetá, Vereda Villaraz

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Carpintero bellotero

Nombre científico: *Melanerpes formicivorus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: INS

 Florencia, Caquetá, Puerto Arango

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Carpintero amarillo

Nombre científico: *Celeus flavus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: INS

 Florencia, Caquetá, Reserva Buena Vista

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Carpintero real

Nombre científico: *Dryocopus lineatus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: INS

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Pablo Cubillos



Halcón reido

Nombre científico: *Herpetotheres cachinnans*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: VER

📍 Florencia, Caquetá, Vereda Tominejo

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de vertebrados, actuando como controladores de la población o depredadores naturales.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Periquito aliazul

Nombre científico: *Brotogeris cyanoptera*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia, Caquetá, Puerto Arango

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Guacamaya azuliamarilla

Nombre científico: *Ara ararauna*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Puerto Rico, Caquetá, Vereda Montecristo

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Guacamaya bandera

Nombre científico: *Ara macao*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 San Vicente del Caguán, Caquetá, Cajones del Rio Pato

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Cotorra ojiblanca

Nombre científico: *Psittacara leucophthalmus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

 Florencia, Caquetá, Zona Urbana

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Batará crestibarrado

Nombre científico: *Thamnophilus multistriatus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: INS

 Florencia, Caquetá, Vereda Paraiso

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Hormiguerito estriado

Nombre científico: *Myrmotherula multostriata*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: INS

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Pablo Cubillos



Hormiguero carinegro

Nombre científico: *Myrmoborus myiotherinus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: INS


 Florencia, Caquetá, Vereda Villaraz

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Zumbador pechigris

Nombre científico: *Conopophaga castaneiceps*

UICN: 

Gremio de forrajeo: INS

📍 Florencia, Caquetá, Reserva La Tortuga

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Saltarin coroniazul

Nombre científico: *Lepidothrix coronata*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Cesar Trujillo



Saltarin barbiblanco

Nombre científico: *Manacus manacus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Pablo Cubillos



Saltarin cola de alambre 🪶

Nombre científico: *Pipra filicauda*

UICN: **LC**

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Cesar Trujillo



Saltarin cabecidorado

Nombre científico: *Ceratopipra erythrocephala*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos,

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Cesar Trujillo



Frutero verdinegro

Nombre científico: *Pipreola riefferi*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia, Caquetá, Balcón de los Tucanes

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Gallito de roca

Nombre científico: *Rupicola peruvianus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU / INS

 Florencia, Caquetá, Vereda Sucre

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos y en algunas ocasiones de insectos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Frutero negro

Nombre científico: *Querula purpurata*

UICN:  VU

Gremio de forrajeo: FRU / INS

📍 Cartagena del Chairá, Caquetá, Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos y en algunas ocasiones de insectos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Camila Sánchez



Toropisco

Nombre científico: *Pyroderus scutatus*

UICN:  VU

Gremio de forrajeo: FRU / INS

📍 Florencia, Caquetá, Vereda la Ruidosa

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos y en algunas ocasiones de insectos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo

Orden: Passeriformes
Familia: Cotingidae



Paragüero

Nombre científico: *Cephalotes ornatus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU / INS

📍 San vicente del caguán, Caquetá, Cajones del rio Pato

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos y en algunas ocasiones de insectos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Cotinga real

Nombre científico: *Cotinga cayana*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Pablo Cubillos



Gritón del bosque

Nombre científico: *Lipaugus fuscocinereus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia, Caquetá, Balcon de los Tucanes

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Titira colinegro

Nombre científico: *Tityra cayana*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

 Florencia, Caquetá, Vereda La Holanda

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Cotinga ceniciento

Nombre científico: *Laniocera hypopyrra*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU / INS

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos y en algunas ocasiones de insectos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Cesar Trujillo



Cabezón barrado

Nombre científico: *Pachyramphus versicolor*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: INS

 Florencia, Caquetá, Vereda el Divino Niño

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores..

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Sinsote lagunero

Nombre científico: *Donacobius atricapilla*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: INS

 Puerto Rico, Caquetá Vereda Montecristo

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos, se entiende como controladores de la población de insectos y en algunas ocasiones evitan la propagación de plagas o de especies transmisoras de vectores.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Clorofonia pechicastaña

Nombre científico: *Chlorophonia pyrrhophrys*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: INS / GRA

 Florencia, Caquetá Vereda La Ruidosa

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques..

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Chirlobirlo

Nombre científico: *Sturnella magna*

UICN:  NT

Gremio de forrajeo: INS / GRA

 Cartagena del Chairá, Caquetá Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de insectos y en alguna ocasiones de semillas en zonas de cultivos, actuando principalmente como contralador de plagas.

Fotografía:

Pablo Cubillos



Tangara coroniblanca

Nombre científico: *Sericossypha albocristata*

UICN:  VU

Gremio de forrajeo: FRU

 Florencia, Caquetá, Vereda Sucre

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Pinchaflor glauco

Nombre científico: *Diglossa glauca*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia, Caquetá, Reserva la Tortuga

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques..

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Papayero

Nombre científico: *Saltator maximus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

 Florencia, Caquetá, Balcon de los Tucanes

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques..

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Arrocero buchicastaño

Nombre científico: *Sporophila angolensis*

UICN: 

Gremio de forrajeo: GRA

 Puerto Rico, Caquetá, Vereda Montecristo

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de semillas que busca en zonas de cultivos como maíz y arroz, por lo que actúa como dispersor de semillas de cultivos alimenticios.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Tangara orejinaranja

Nombre científico: *Chlorochrysa calliparea*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

 Florencia, Caquetá, Reserva la Tortuga

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Tangara carinegra

Nombre científico: *Schistochlamys melanopsis*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques..

Fotografía:

Pablo Cubillos



Algodonero

Nombre científico: *Cissopis leverianus*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia Caquetá, Balcon de los Tucanes

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Tangara lorito



Nombre científico: *Chlorornis riefferii*

UICN: LC

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia Caquetá, Vereda La Ruidosa

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Tangara tigrera

Nombre científico: *Stilpnia cayana*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

 Cartagena del Chairá, Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Cesar Trujillo



Tangara siete colores

Nombre científico: *Tangara chilensis*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU / INS

 Florencia Caquetá, Vereda El Divino Niño

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos y en algunas ocasiones de insectos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Tangara pechirrufa

Nombre científico: *Tangara chrysotis*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

📍 Florencia Caquetá, Vereda Santa Helena

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Tangara dorada

Nombre científico: *Tangara arthus*

UICN:  LC

Gremio de forrajeo: FRU / INS

📍 Florencia Caquetá, Reserva La Tortuga

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos y en algunas ocasiones de insectos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Tangara rubicunda

Nombre científico: *Tangara parzudakii*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

 Florencia Caquetá, Vereda Santa Helena

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Tangara puncteada

Nombre científico: *Ixothraupis xanthogastra*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

 Florencia Caquetá, Vereda Villaraz

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Yuldor Trujillo



Tangara golondrina

Nombre científico: *Tersina viridis*

UICN: 

Gremio de forrajeo: FRU

 Cartagena del Chairá Caquetá, Vereda Lobitos

Importancia de la especie:

Se alimenta principalmente de frutos, actuando como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración de los bosques.

Fotografía:

Pablo Cubillos

Reconocimientos



YULDOR TRUJILLO

Por su valioso aporte y donación de material audiovisual, y por su compromiso en la visibilidad de la riqueza natural de la región.



CESAR TRUJILLO

Por su aporte fotográfico y la edición del libro, contribuyendo a la calidad y coherencia de esta publicación.



DAYANA OSPINA

Por conocimiento y aporte a la clasificación taxonómica de las aves y el valioso aporte de imágenes de su archivo personal.



PABLO CUBILLOS

Por la clasificación taxonómica de las aves y el valioso aporte de imágenes de su archivo personal.



JOAQUÍN SÁNCHEZ

Por su guía en las salidas de campo, su compromiso con la conservación y el aporte de imágenes de su archivo.



CAMILA SÁNCHEZ

Por plantear y coordinar el proyecto, hacer posible esta publicación y por más de 13 años de trabajo en la conservación de la Amazonía.



JORGE MUÑOZ

Por su dedicación y compromiso en el reconocimiento y visibilidad de las aves del país; y por su valioso aporte en la producción de este material

“Este libro es fruto de la pasión compartida por la biodiversidad del Caquetá y el deseo de que nuestras aves sean conocidas y protegidas por todos.”

